

โรงพยาบาลลำพูน	SOP-PHA- 059
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : แนวทางปฏิบัติการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาที่มี ปฏิกริยาต่อกันรุนแรง	
วันที่ประกาศใช้ วันที่ 12 เมษายน 2554	พิมพ์ครั้งที่ : 1
แก้ไขครั้งที่:	
ผู้จัดทำ	คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยาและ Cop ยา
ผู้ทบทวน	นายแพทย์ชาญชัย วรรณฤทธิ์
	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยา
	เภสัชกรสมพงศ์ คำสาร
	เลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
ผู้อนุมัติ	นายแพทย์วิรัช พันธุ์พานิช
	ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

[illegible]

โรงพยาบาลลำพูน		SOP-PHA- 059	
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : แนวทางปฏิบัติการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาที่มี ปฏิกริยาต่อกันรุนแรง			
วันที่ประกาศใช้ วันที่		แก้ไขครั้งที่:	หน้า : /

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีปฏิกริยาต่อกันรุนแรง

ขั้นตอนการทำงาน

1. การกำหนดคู่ยาที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาโดยพิจารณาจากระดับ
นัยสำคัญของการเกิดปฏิกริยา ซึ่งมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะใช้ยาร่วมกันและส่งผลทางคลินิก
ต่อผู้ป่วย โดยมีการกำหนดประเภทของการเฝ้าระวังดังนี้
 - 1.1 กำหนดคู่ยาห้ามใช้ระดับโรงพยาบาล
 - 1.2 กำหนดคู่ยาเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัย
 - รายละเอียดคู่ยาที่เฝ้าระวังตามที่ระบุไว้ในคู่มือการเฝ้าระวังฯ -
2. ขั้นตอนในการเฝ้าระวัง
 - 2.1 มีการบันทึกข้อมูลคู่ยาที่เฝ้าระวังลงในระบบคอมพิวเตอร์ (PMK) พร้อมข้อมูล
ประเภทคู่ยา (คู่ห้ามใช้หรือเฝ้าระวัง) ระดับนัยสำคัญและแนวทางการจัดการตลอดจน
เผยแพร่แนวทางในการเฝ้าระวังให้ทีมนำทางคลินิก แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาล
 - 2.2 การสั่งใช้ยาของแพทย์ พิจารณาใช้แนวทางในการเฝ้าระวัง ฯ และข้อมูลที่แจ้ง
เตือนการเกิดปฏิกริยาระหว่างกันในคู่ยาที่สั่งใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
 - 2.2.1 แพทย์หลีกเลี่ยงไม่ใช้ยาในคู่ยาที่ห้ามใช้
 - 2.2.2 กรณีสั่งใช้ยาในคู่ยาติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัย แพทย์พิจารณาใช้
แนวทางการจัดการ ฯ ประกอบการสั่งใช้ตามความเหมาะสม และอาจจะพิจารณา
สื่อสารให้เภสัชกรทราบในการสั่งใช้ยาบางคู่ยา
 - 2.3 เภสัชกรพิจารณาใช้แนวทางในการเฝ้าระวัง ฯ และข้อมูลที่แจ้งเตือน
การเกิดปฏิกริยาระหว่างกันในคู่ยาที่สั่งใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
 - 2.3.1 กรณีสั่งใช้ยาที่มีคู่ห้ามใช้ แจ้งแพทย์ทบทวนการสั่งใช้ยา
 - 2.3.2 กรณีสั่งใช้ยาในคู่ยาติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัย เภสัชกรพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา และปรึกษาแพทย์ กรณีที่คาดว่าจะกระทบ
ต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพต่อการรักษาของผู้ป่วย หรือให้คำแนะนำผู้ป่วย
ในการบริหารยาหรือการใช้ยาที่เหมาะสมตลอดจนติดตามสังเกตอาการไม่พึง
ประสงค์ การใช้ยา และแนวปฏิบัติในกรณีที่พบว่าเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ที่
รุนแรง ควรรีบกลับมาพบแพทย์ หรือโทรปรึกษาแพทย์/เภสัชกร

พิมพ์

โรงพยาบาลลำพูน		SOP-PHA- 059
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : แนวทางปฏิบัติการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีปฏิกริยาต่อกันรุนแรง		
วันที่ประกาศใช้ วันที่	แก้ไขครั้งที่:	หน้า : /

2.4 พยาบาลพิจารณาใช้แนวทางในการเฝ้าระวัง ประกอบในการรับคำสั่ง และในการบริหารยา หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร และอาจจะพิจารณาขอความร่วมมือผู้ป่วยในการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ในบางผู้ป่วยตามความเหมาะสม และหากพบอาการไม่พึงประสงค์รายงานแพทย์และเภสัชกร เพื่อติดตามประเมิน ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาและรายงานอุบัติการณ์เข้าสู่ระบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

3. การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ

3.1 คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยาร่วมกับเภสัชกรรมและคณะกรรมการความเสี่ยงร่วมกันติดตามจากระบบรายงานอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา และระบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

3.2 คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องใน ข้อ 3.1 ร่วมกับ Cop ยาพิจารณาทบทวน คู่มือการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ (Compliance) และผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้ป่วย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง