

ระเบียบปฏิบัติ

Quality Procedure

เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยาที่ Fatal Drug Interaction



กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลลำพูน

รหัสเอกสาร LP-QP-PHA-002		ทบทวน/แก้ไขครั้งที่ 0	ลายเซ็น	วัน เดือน ปี
ผู้จัดทำ	ภญ.สุกฤษณ์ วงศ์ปาลิย์ เภสัชกรชำนาญการ			15 ธ.ค. 63
ผู้ทบทวน	ภก.สัมฤทธิ์ จุฑารัตน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ			15 ธ.ค. 63
ผู้อนุมัติ	แพทย์หญิงจุฬามาศ สมชาติ ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลลำพูน			15 ธ.ค. 63



LP-QP-PHA-002

ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure)

เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา Fetal drug interaction

ทบทวน/แก้ไขครั้งที่ 0

หน้า 2/4

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลลำพูน ห้ามนำออกไปใช้ภายนอก หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม	LP-QP-PHA-002
	ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure)	
	เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา Fatal drug interaction	
	ทบทวน/แก้ไขครั้งที่ 0	หน้า 3/4

1. วัตถุประสงค์

- 1.1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง
- 1.2. เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

2. ขอบเขต

ใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังการใช้ยา Fatal drug interaction สำหรับ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โรงพยาบาลลำพูนเท่านั้น

3. นิยามและคำย่อ

- 3.1. ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง (fatal drug interaction) หมายถึง ยาที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา 2 ชนิด อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หรือปรับขนาดยาให้เหมาะสม โดยโรงพยาบาลกำหนดยาที่มีอันตรกิริยารุนแรงทั้งหมด 36 คู่ ตามเอกสารแนบท้าย

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5. ขั้นตอนการดำเนินการ

5.1. เภสัชกร


- 5.1.1. ทบทวนยาที่เกิดอันตรกิริยาที่มีอยู่แล้วของโรงพยาบาล
 - ยา fatal drug interaction 36 คู่
 - เฝ้าระวังยา drug interaction 262 คู่
- 5.1.2. เผยแพร่ข้อมูลยาที่มีอันตรกิริยาคือกันแก่บุคลากรทางการแพทย์
 - แพทย์ประกอบการตัดสินใจในการสั่งจ่ายยา กรณีห้ามใช้ ไม่สามารถสั่งจ่ายได้
 - เภสัชกรประกอบการคัดกรองคำสั่ง
- 5.1.3. กรณีผู้ป่วยใน ยืนยันคำสั่งใช้ยากับแพทย์ผู้รักษา ในกรณีที่แพทย์สั่งจ่ายยาที่มีอันตรกิริยา
- 5.1.4. ให้ข้อมูลแก่แพทย์ในด้านการจัดการและตรวจติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เหมาะสม ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับยาที่มีอันตรกิริยา
- 5.1.5. นำข้อมูลที่มีการสั่งใช้ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง มาทบทวนการเฝ้าระวัง
- 5.1.6. ทบทวนรายการยาเข้าใหม่ทุกปีว่าสามารถเกิดอันตรกิริยากับยาใดได้บ้าง แล้วบันทึกแจ้ง

	กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม	LP-QP-PHA-002
	ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure)	
	เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา Fatal drug interaction	
	ทบทวน/แก้ไขครั้งที่ 1	หน้า 4/4

5.2. แพทย์

5.2.1. ไม่สั่งยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง (Fatal drug interaction)

5.2.2. สามารถสังเกตการณ์แจ้งเตือนจากระบบสารสนเทศ โดยการแจ้งเตือนดังกล่าวจะระบุผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการจัดการของอันตรกิริยาดังกล่าว ตัวอย่าง



Drug Interaction Found

ATAZANAVIR + CARBAMAZEPINE: Risk of decreased efficacy

Drug	Strength	Quantity	Unit
ATAZANAVIR	300 MG	10	Tablets
CARBAMAZEPINE	1000 MG	10	Tablets

5.2.3. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน แพทย์ควรให้ข้อมูลถึงความจำเป็น, ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีการตรวจติดตามอาการ ไม่พึงประสงค์จากยาแก่ผู้ป่วย

5.3. พยาบาล

5.3.1. รายงานแพทย์และเภสัชกรหากพบอาการหรือสัญญาณของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่สัมพันธ์กับการได้รับยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง

6. Flow chart

-

7. เอกสารอ้างอิง

-

8. แบบบันทึกคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

-