

ใบคล้องโลหิต

AB

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำพูน

รายงานการเกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิต

ชนิดของอาการที่เกิด

- () มีไข้ () หนาวสั่น () ผื่นแดง () ปวดหัว
() อาเจียน () ปวดหลัง () ตัวเขียว () หายใจขัด
()

เวลาให้โลหิต.....

เวลาเกิดอาการ.....

ผู้บันทึก(บรรจง).....

วันที่.....เวลา.....

	BP(mmHg)/PR(/min)	BT(°c)
ก่อนให้		
หลังให้		

เมื่อผู้ป่วยมีปฏิกิริยาจากการรับโลหิต ควรปฏิบัติดังนี้

1. หยุดให้โลหิตทันที
2. รายงานแพทย์
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด
4. เจาะโลหิตผู้ป่วยหลังเกิดปฏิกิริยา 4 cc.
พร้อมโลหิตหน่วยนั้นคืนงานธนาคารเลือด

นำกระติกพร้อม ICE PACK

มารับโลหิตทุกครั้ง

ถ้ายังไม่พร้อมให้ผู้ป่วย ส่งคืนธนาคารเลือดทันที